per cn. Guerard de dipeldorp

observations servir a pour eclairer la theorie des hernies de naissance

1ere observation.

Le 12e. Mars année 1773, le nommé neeker Soldat du Regiment de bitkenfeld agé denviron 22 ans étant mort a Lhopital des Suites dulceres du poulmon et dune hydropisie de poitrine, fut porté a Lamphitheatre pour en faire louverture, et comme je trouvai le coté droit du Scrotum plus gros qua lordinaire je lexaminai et y remarquoi une hernie avec une tumeur Singuliere a sa partie inferieure dans laquelle le testicule etoit Compris, Cequi me fit naitre Lidée de lexposer tant par curiosité que pour linstruction des eleves, jappris en meme temps des chirurgiens du regiment que ce Sujet portoit cette hernie depuis sa tendre jeunesse, Sans lavoir jamais retenue par aucun bandage on Sentoit depuis lanneau jusquau testicule une tumeur longuette, peu eminente que je pris pour une epiplocele, en maniant la tumeur du testicule elle etoit mollette et cedoit Sous le doigt approchant comme lorsquon en Comprime une petite vessie a demi pleine deau, on y Sentoit fluctuation, et en Considerant avec attention la tumeur herniaire, on sappercevoit quon laugmentoit par la Compression de celle ci. je ne tentai aucune reduction par la raison deja annoncée, et aprés avoir fait lincision longitudinale, jouvris en meme temps le crémaster et le Sac herniaire, jallongai louverture de haut et bas le Sac etoit assez epais, jy trouvai une portion longuette depiploon qui paroissoit tendiee et bridée et nétre retenüe dans le Sac que par les adheronces quelle y avoit Contractée le long de sa partie posterieure et a son fond, en relevant Cette portion depiploon, on entrainoit en meme temps le testicule, de Sorte quil auroit été facile de Limaginer que lépiploon etoit immédiatement adherent a le Corps joignant la tete de lepididime, par une bride ligamenteuse, en Comprimant

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
ARC 142.5 n°1

la tumeur du testicule on faisoit penetrer dans
le sac herniaire par dessus lepiploon une tumeur
aqueuse qui a cause de la finesse de sa membrane
representoit assez bien une hydatide de la —
grosseur dune bonne datte, un peu inégale, —
elle penetroit par une ouverture du fond du sac
herniaire, et je reconnus que son kiste, ou cette
fine membrane nétoit que la continuation de la —
tunique vaginale propre au testicule, de sorte
que lon peut dire que cette membrane faisoit
hernie dans le sac herniaire de lepiplocele —
toutes les fois quon comprimoit la tumeur du
testicule ; ayant ouvert cette membrane
elle se trouvat pleine dune sérosité un peu
jeaune, Cestoit donc une hydrocele le testicule
étoit sain.
je détachai ensuite les adhesences de lepiploon
sans le faire rentrer, je ne pus parvenir meme
en le tirant par linterieur du ventre a cause —
de ses adherences a la circonference de lanneau
prevoyant les difficultés que jaurois a les détacher —
en dilatant lanneau par incision, je crus devoir
auparavant tenter di reussir, en tirant une —
plus grande portion depiploon au dehors —
Cequi me réussit aisément et me procurat la —
facilité de coupar les adhesences restantes, apres
quoi il rentra sans peine.

Réflexions.

je ne pus savoir si lintestin avoit jamais accom=
pagné cette hernie, lorc du colon étoit bien plus —
inferieur que dordinaire, il paroissoit avoir été
entrainé par lepiploon, la grandeur du sac et
son épaisseur ma fait juger quil a du contenir —
une plus grande quantité depiploon que celle
que jy ai trouvé, si toutefois lintestin ne la pas —
accompagné ; la portion depiploon contenue dans —
le sac herniaire y étoit si tendus et si mince —
quon auroit pu aisement la prendre pour un
sac épais, et ordonner lusage du brayer aprés —

quon auroit réduit la portion la plus consi
derable des parties faisant hérnies, et il seroit
devenu nuisible ou on n'auroit pu le suporter_
jai vu des cas semblables, Celui ci n'a il pas_
beaucoup de rapport avec celui de Monsieur_
Zimmerman médecin très célèbre actuellement
a hannovre, Connu dailleurs non seulement a cause
de son savoir, mais aussi a cause de la fameuse
operation quil s'est faire a berlin a son sujet_
Si par une chute, une forte Compression ou toute
autre Cause, la membrane délicate de l'hydrocéle_
qui faisoit hernie, eut été rompue dans le
sac herniaire _il est probable que cette mala_
die auroit tout alors disparu, puisque l'eau_
se seroit epanchée dans le ventre en y remon=
tant par l'anneau. et auroit guerie de cette
maniere _ je crois au moins quon n'auroit pu_
distinguer cet état d'une veritable guerison.
pouvoit on au juste reconnoitre cette maladie
et la distinguer de toute autre apostème du testi_
cule par les signes ordinaires d'une hydrocele_
commencante, ceux qui les connoissent savent
Combien il est quelque fois difficile de les_
distinguer du squire du testicule a cause de
sa grande tension.

2.e observation

Curieuse de disséquer le testicule gauche du
meme sujet, quoiquon n'y remarquat rien de contre
nature je le fis séparer avec son cordon et
meme l'anneau, aprés avoir disséqué et meme
enlevé le crémaster et avoir ainsi mis a decou_
vert une bonne partie de la membrane vaginale
du testicule, ou membrane érithroide, je l'ouvris
pour y souffler au moyen d'un tube que j'y_
adaptai, je la distendi en meme temps quune
éspéce de sac herniaire longuet qui s'étendoit
le long des vaisseaux spermatique jusqua l'anneau
par ou l'air séchapoit, il étoit semblable a
celui du coté opposé, et représentoit on ne peut

ACADÉMIE ... MÉDECINE

mieuse la tunique vaginale telleque les anatomis_
tes la décrivent mal apropos. j'y fis de meme
penetrer l'air par louverture de lanneau il s'in_
sinuat aussi avec facilité jusques dans la cavité
de la membrané érithroide, ce sac étoit de —
la longueur environ de quatre poulces, assez mince
et plus large vers son milieu que vers ses extré
mités, les extremité inferieure distendue faisoit emi_
nence dans la cavité de la membrane vaginale —
du testicule vis avis la tête de lepydidime, c'étoit
la que se trouvoit louverture de Communica —
tion mais très petite.

Réflexions.

Ce Sujet n'avoit point de hernie du Coté
gauche, y étoit Sujet, je nai pus lapprendre —
le sac herniaire étoit mince, et il avoit une
ouverture de Communication avec le testicule —
Comment cette ouverture s'est conservée pendant
si longtemps quoique du coté droit elle se
fut obliterée, comme il a été prouvé par —
l'hydrocele qui s'étoit formée dans la mem_
brane érithroide.
ou bien cette ouverture s'est elle formée —
approchant, comme cela seroit arrivé si l'hy_
drocele du coté droit setoit fait jour dans —
le sac herniaire.
Si le Sujet dont il s'agit avoit une hernie de
ce coté étoit elle de naissance ou non, dans —
ce dernier cas les parties tombées dans le sac —
pourroient elles pu dilater louverture de la —
membrane vaginale du testicule, et y former
une hernie? la circonstance de la presence
de cet organe dans un sac herniaire n'est —
donc pas une preuve certaine que la hernie —
soit de naissance.

Ces observations, approuvées par mons^r Brandt me paroissent faites
avec beaucoup d'inexactitude, et il me semble que l'auteur n'entend rien
à la maniere dont se forment les hernies de naissance.